

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА

НАТУРКОКСИНУМ

Регистрационный номер

ЛСР-007708/09

Торговое название препарата

Натуркоксинум

Лекарственная форма

Гранулы гомеопатические.

Состав (на 100 г)

Активный компонент: *Anas barbariae, hepatis et cordis extractum*

(утки барбарийской печени и сердца экстракт) 200К – 1,00 г,

Вспомогательные компоненты: гранулы нейтральные (сахароза, лактоза) – 99,00 г

Описание

Гранулы сферической формы от белого до почти белого цвета, практически без запаха, легко растворимы в воде.

Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое средство.

Фармакологическое действие

Гомеопатический препарат, действие которого обусловлено активными компонентами, входящими в его состав.

Показания к применению

Лечение и профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам препарата.

Непереносимость галактозы, дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Применение при беременности и в период лактации

Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

Способ применения и дозы

Дозировка зависит от стадии заболевания и не зависит от возраста пациента.

Положить под язык содержимое тубы (1 доза = 1 грамм) и держать до полного растворения.

Детям до 5-ти лет растворять содержимое тубы в небольшом количестве воды и давать из ложечки или бутылочки с соской.

Принимать препарат за 15 минут до или через 1 час после приема пищи.

Для профилактики в период распространения ОРВИ, до появления симптомов заболевания, принимать по 1 дозе 1 раз в неделю.

При появлении первых симптомов принять 1 дозу, затем повторить прием препарата 2-3 раза с интервалом в 8 часов.

При выраженных симптомах заболевания по 1 дозе 2 раза в день (утром и вечером) в течение 1-3 дней.

Побочное действие

На настоящий момент информация о побочных действиях препарата отсутствует. Возможны аллергические реакции. При возникновении побочных эффектов следует обратиться к врачу.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Прием гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания

Чем раньше начато лечение, тем быстрее и эффективнее проявляется действие препарата.

При сохранении выраженных симптомов заболевания (температура, озноб) в течение 24 часов с момента начала лечения необходимо обратиться к врачу.

Информация для больных сахарным диабетом: 1 доза препарата содержит 0,1 хлебной единицы.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами

Не влияет.

Форма выпуска

Гранулы гомеопатические. По 1 г в тубу из полимерных материалов с полимерной пробкой.

По 3 тубы в пластиковом поддоне. По 1, 2, 3 или 4 пластиковых поддона вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

Условия хранения

В сухом месте при температуре от 15 до 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Предприятие-производитель

ГОМЕОКАН ИНК., 3025, Бульвар де л'Ассомпсьон, Монреаль, Квебек, H1N 2H2 Канада.

Представительство в России/ Организация, принимающая претензии потребителей

ООО «Грея», 199034, Санкт-Петербург, 14-я линия В.О. д.7 лит. А, эл. почта

info@giantera.ru.